

## Expektorantien

### Bronchicum (Thymian)

Cave Alkohol!

6Mo-1J: 6x 1ml    1-4J: 6x 2,5ml    >4J: 4x 7,5ml

### Prospan (Efeu)

ab 1J

1-6J: 2x 2,5 ml    6-12: 2x 5 ml    >12: 3x 5 ml

## Antitussiva

### Noscapin (Capval)

ab 6 Mo

zur Nacht! Nicht wenn obstruktiv! Nicht im 1. Trimenon!

UAW: Müdigkeit, Rhinitis, GI

6Mo-3J: 2x 2,5ml    3-12J: 3x 5ml    >12J: 3x 10ml

### Pentoxyverin (Sedotussin, Silomat)

ab 2 J

UAW v.a. Kleinkinder: Atemdepression, Krampfanfälle

Dosierung nach kg

### Dextromethorphan (HUSTENSTILLER-ratio) ab 12 J

Cave neurologische UAW (Ataxie, Koma) v.a. <6J,

Halluzinationen

1 Kpsl 1-4x / d

### Levodropropizin (Quimbo)

ab 2 J

UAW

3mg/kg/d in 3ED (>12J 60mg/d in 3 ED)

### Codein (Tryasol)

ab 12 J

Cave auch >12J: nicht bei Atemwegsinfekt,

Herzerkrankungen, etc! Atemdepression!

1° = 1mg    max alle 6-8h 15-44mg

Stand: 12.05.2023, Quelle: <https://roder.xyz>